

FUNGICIDA BORDOLESE FLOW

FUNGICIDA A BASE DI SOLFATO DI RAME

Punti di forza:

- Efficacia, persistenza e resistenza al dilavamento
- PFnPE
- Sospensione concentrata

Formulazione:

liquido a sospensione concentrata



Campo di impiego:

Vite, olivo.

Lotta contro:

Peronospora, Occhio di Pavone.

Dosi consigliate:

Applicare su una superficie massima di 5000 m².

Vite: Dose ml/ 50 m² 40 ml Pre fioritura fino alla raccolta.

Olivo: Dose ml/ 50 m² 50ml Trattamenti da fine inverno all'invasatura, e dopo la raccolta.

Registrazione:

BORDOFLOW NEW PFnPE

Registrazione Ministero della Salute n 18232 del 30/12/2022

SDS: SI

Confezioni disponibili:

Flacone	500 ml	Dose per 50 lt d'acqua	406847.NP
---------	--------	------------------------	-----------

Comunicazione riservata ad Agenti di vendita, operatori professionali e personale tecnico specializzato.

*Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Le informazioni sono a carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore è tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti. Il rispetto delle istruzioni riportate sulle etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Zapi SpA declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.

Si fa presente a tutti i rivenditori che la pubblicità e la vendita on line di alcune tipologie di prodotti esposti nel presente sito potrebbe essere soggetta a specifiche norme e restrizioni. Al fine di effettuare vendite a distanza o sui siti internet o pubblicità (ad es. sui social networks) di prodotti contenuti nel presente catalogo, è necessario attenersi a tali norme, la cui conoscenza ed applicazione è sotto la responsabilità unica di chi intende effettuare tale tipologia di attività.

Composizione

Rame metallo 10% p/p (124 g/L) (sotto forma di poltiglia bordolese);
Coformulanti q.b. a 100% p/p