

ZAPICID PLUS FORMICHE 7g

ESCA INSETTICIDA PRONTO USO



Punti di forza

- Gel super appetibile con Tecnologia MIGALT
- Efficace fino a 3 mesi
- Siringa per trattamenti localizzati
- Prodotto Biocida

Formulazione

esca in gel pronto all'uso in siringa.

Campo d'impiego

Ambienti interni: in crepe e fessure, lungo i muri. Ambienti esterni: in crepe e fessure, nei dintorni d'edifici o all'entrata di formicai.

Lotta contro

formiche nere (*Lasius niger*), formica argentina (*Linepithema humile*), formica faraone (*Monomorium pharaonis*) e i loro formicai.

Metodo d'applicazione

applicare il prodotto in gocce, su superfici orizzontali non assorbenti, lungo i passaggi frequentati dalle formiche o nelle crepe e fessure o all'entrata di formicai.

Modalità d'impiego

rimuovere il tappo dalla siringa e, facendo toccare la punta del beccuccio sulla superficie da trattare, premere lentamente il pistone dosando il prodotto a gocce. Richiudere accuratamente il beccuccio una volta completato il trattamento.

Dosaggio e frequenza d'impiego

2 gocce da 0,05 g (5 mm di diametro) ogni metro lineare o per ogni entrata di formicaio. Applicare al massimo 30 gocce da 0,05 g per formicaio (pari a 1,5 g di prodotto). Verificare regolarmente il consumo del prodotto e sostituirlo quando è esaurito. Il prodotto raggiunge la sua completa efficacia entro 2 settimane dall'applicazione e rimane efficace fino a 3 mesi dalla sua applicazione. Ripetere l'applicazione ogni 3 mesi o prima se l'esca è alterata o consumata completamente.

Registrazione

ZAPICID PLUS FORMICHE - Prodotto biocida PT-18 Autorizzazione Ministero della Salute n. IT/2021/00766/AUT
SDS: SI / DI LIBERA VENDITA

Periodo
d'impiego

GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Confezioni disponibili:

Astuccio blister 1 siringa da 5 g

418283

Comunicazione riservata ad Agenti di vendita, operatori professionali e personale tecnico specializzato.

*Attenzione: seguire attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto. Le informazioni sono a carattere informativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta di ogni singolo prodotto. L'utilizzatore è tenuto a leggere e attenersi a quanto riportato sulle etichette dei prodotti. Il rispetto delle istruzioni riportate sulle etichette della confezione è essenziale per il corretto uso del prodotto e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Zapi SpA declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione di qualsiasi norma.

Si fa presente a tutti i rivenditori che la pubblicità e la vendita on line di alcune tipologie di prodotti esposti nel presente sito potrebbe essere soggetta a specifiche norme e restrizioni. Al fine di effettuare vendite a distanza o sui siti internet o pubblicità (ad es. sui social networks) di prodotti contenuti nel presente catalogo, è necessario attenersi a tali norme, la cui conoscenza ed applicazione è sotto la responsabilità unica di chi intende effettuare tale tipologia di attività.

Composizione

Imidacloprid (N° CAS 138261-41-3)
0,0204% (0,02% puro) contiene un agente amaricante (denatonium benzoate)



Scheda aggiornata il 5 mag 2026

Scaricata il 10 mag 2026

QUALITÀ | ISO 9001
SALUTE E SICUREZZA | OHSAS 18001
AMBIENTE | ISO 14001

